

beaphar®

Parecto®

Formulé à base d'imidaclopride
et de fluméthrine.



Tue et repousse les tiques
jusqu'à **8 mois**.



Tue les puces
pendant **5.5 mois** pour les chats
et pendant **6 mois** pour les chiens.



Réduit le risque que les chiens
contractent la Leishmaniose
transmise par les phlébotomes
pendant **8 mois**. L'effet est
indirect via l'activité du médicament
vétérinaire contre les vecteurs.



Protection prouvée

Beaphar Parecto®

Beaphar Parecto® est un collier médicamenteux pour chiens et chats. Formulé à base d'imidaclopride et de fluméthrine, un collier assure jusqu'à 8 mois de protection antiparasitaire contre les tiques.

	 Tue et repousse les tiques jusqu'à 8 mois.
	 Tue les puces pendant 5.5 mois pour les chats et pendant 6 mois pour les chiens.
	 Réduit le risque que les chiens contractent la Leishmaniose transmise par les phlébotomes pendant 8 mois. L'effet est indirect via l'activité du médicament vétérinaire contre les vecteurs.

Efficacité confirmée par 12 études cliniques

L'efficacité de Beaphar Parecto® est étayée par des données cliniques. Son efficacité contre les tiques, les puces et les phlébotomes a été évaluée dans le cadre de 12 études conformes aux BPC (Bonnes Pratiques Cliniques).

Ces études, menées selon les normes de qualité internationales les plus strictes, constituent une base scientifique solide sur laquelle vous pouvez vous appuyer en toute confiance lors de vos échanges avec vos clients.

Fonctionnalité	Beaphar Parecto®	Seresto
Substances actives	✓ Imidaclopride et Fluméthrine	Imidaclopride et Fluméthrine
Dosage	✓ 10% w/w Imidaclopride, 4.5% w/w Fluméthrine	10% w/w Imidaclopride, 4.5% w/w Fluméthrine

Double action : Imidaclopride et Fluméthrine

Beaphar Parecto® associe ces deux principes actifs reconnus au sein d'une matrice polymère sophistiquée. Cette structure agit comme un réservoir, assurant une diffusion constante et continue des principes actifs pendant une durée allant jusqu'à 8 mois.



Imidaclopride
Tue les puces

Au contact de l'**imidaclopride**, le système nerveux central des puces est perturbé par une interruption de la transmission de l'influx nerveux. Il en résulte une paralysie qui les empêche de se nourrir en 3 à 5 minutes, et entraîne leur mort en 20 minutes. Une protection continue interrompt le cycle de vie des puces en les tuant avant la ponte.



Fluméthrine
Tue et repousse les tiques

Au contact de la **fluméthrine**, le système nerveux des tiques est surstimulé, ce qui entraîne leur paralysie et leur mort. De plus, la fluméthrine exerce un effet répulsif, obligeant les tiques à interrompre leur repas sanguin et à quitter l'animal avant de le piquer. Ceci contribue à réduire le risque de transmission de maladies.



Alors que l'imidaclopride cible les puces, l'ajout de fluméthrine permet une action contre les tiques et réduit le risque de Leishmaniose chez les chiens, une maladie transmise par les phlébotomes.

Diffusion continue, protection constante

Contrairement aux traitements oraux, Beaphar Parecto® agit en surface de la peau. L'imidaclopride et la fluméthrine sont libérés progressivement de la matrice polymère du collier dans la couche lipidique naturelle de la peau et du poil.


Ces substances actives se diffusent rapidement **sur la surface du corps**, créant un « bouclier » protecteur invisible. Ainsi, les parasites sont tués ou repoussés par simple contact, avant même d'avoir pu piquer.



Agit à la surface de la peau

Imidaclopride ○

Fluméthrine ○



1. Les principes actifs sont stockés dans le collier :

Imidaclopride et fluméthrine.

2. Libération continue :

De petites quantités de ces principes actifs sont libérées progressivement sur la peau et le pelage de l'animal.

3. Diffusion des principes actifs :

Les principes actifs se diffusent sur tout le corps grâce au film hydrolipidique naturel de la peau.


4. Protection continue :

Les tiques sont repoussées et tuées avant de piquer, tandis que les puces sont rapidement paralysées et éliminées.


Comment appliquer Beaphar Parecto®



**Chiens
jusqu'à 8 kg**
Réglable
jusqu'à 38 cm



**Chiens
de plus de 8 kg**
Ajustable
jusqu'à 70 cm



Chats
Ajustable
jusqu'à 38 cm



Mécanisme de sécurité

Tous les colliers sont équipés d'un mécanisme de sécurité. Les colliers pour petits chiens et chats possèdent également une zone de sécurité supplémentaire en zigzag qui s'élargit ou se déchire sous tension, permettant ainsi à l'animal de se libérer en toute sécurité si le collier se coince.



Beaphar Parecto® vs Canishield®



VS



Jusqu'à 8 mois	Tiques 	6 mois
Tue et repousse : <i>Ixodes ricinus</i> <i>Dermacentor reticulatus*</i> <i>Rhipicephalus sanguineus*</i> *chien uniquement		Tue et repousse : <i>Ixodes ricinus</i>
Pendant 5.5 mois pour les chats et pendant 6 mois pour les chiens	Puces 	4 mois
Tue : Ctenocephalides felis		Tue : Ctenocephalides felis
Pendant 10 semaines pour les chats - Pendant 3 mois pour les chiens	Environnement 	X
Protège contre : le développement des larves de puces		
Jusqu'à 8 mois	Phlébotomes 	6 mois
Réduit le risque de transmission de la Leishmaniose aux chiens par les phlébotomes.		Réduit le risque de transmission de la Leishmaniose aux chiens par les phlébotomes.
Chiens et chats	Expèces cibles 	Chiens
Convient aux chiens à partir de 7 semaines et aux chats à partir de 10 semaines.		Convient aux chiens à partir de 7 semaines.
Imidaclopride + Fluméthrine	Substances actives	Deltaméthrine
Un insecticide contre les puces et un acaricide contre les tiques		Un insecticide et acaricide pyréthroïde de synthèse
Tue et repousse pendant 2 à 16 jours* *varie selon l'espèce de parasite	Début de l'action	Tue à partir de 7 jours
	Résiste à l'eau, en cas d'exposition modérée	
	Sans odeur	
	Ajustable	
	Mécanisme de sécurité	X

1 collier = jusqu'à 8 mois de protection antiparasitaire contre les tiques



Évitez tout contact prolongé avec le collier lors de la pose sur l'animal et également lorsqu'il est porté par l'animal traité.

beaphar®

Nos animaux sont aussi notre famille

Parecto®, colliers médicamenteux pour chiens ou chats. Imidaclopride & Fluméthrine. **Ingrédients :** 1 collier Chat de 38 cm contient : Imidaclopride 1.25 g, Fluméthrine 0.56 g. 1 collier Chien jusqu'à 8 kg de 38 cm contient : Imidaclopride 1.25 g, Fluméthrine 0.56 g. 1 collier Chien de plus de 8 kg de 70 cm contient : Imidaclopride 4.50 g, Fluméthrine 2.03 g. **Espèces cibles :** Chat ou Chien. **Indications :** Chez les chats infestés ou à risque d'infestations parasitaires mixtes par des puces et des tiques. Le médicament vétérinaire n'est indiqué que lorsqu'il est nécessaire de l'utiliser simultanément contre les tiques et les puces. Traitement des infestations et prévention des réinfestations par les puces (*Ctenocephalides felis*) grâce à son activité insecticide pendant 5,5 mois. Le médicament vétérinaire protège l'environnement immédiat de l'animal contre le développement de larves de puces pendant 10 semaines. Le médicament vétérinaire peut être intégré dans un programme thérapeutique de contrôle de la Dermatite Allergique par Piqûres de Puces (DAPP). Prévention des réinfestations par les tiques (*Ixodes ricinus*) grâce à un effet acaricide (léthal) dans les 9 jours suivant l'application du collier et jusqu'à 8 mois, et à un effet répulsif (antigorgement) dans les 2 jours suivant l'application du collier et jusqu'à 8 mois. Il est efficace contre les larves, les nymphes et les tiques adultes. Chez les chiens infestés ou à risque d'infestations parasitaires mixtes par des tiques, des puces et/ou des phlébotomes. Le médicament vétérinaire n'est indiqué que lorsqu'il est nécessaire de l'utiliser simultanément contre les tiques, les puces et/ou les phlébotomes. Traitement des infestations et prévention des réinfestations par les puces (*Ctenocephalides canis* et *Ctenocephalides felis*) grâce à son activité insecticide pendant 6 mois. Le médicament vétérinaire protège l'environnement immédiat de l'animal contre le développement de larves de puces pendant 3 mois. Le médicament vétérinaire peut être intégré dans un programme thérapeutique de contrôle de la Dermatite Allergique par Piqûres de Puces (DAPP). Prévention des réinfestations par les tiques (*Dermacentor reticulatus*), par effet acaricide (léthal) et répulsif (antigorgement) dans les 2 jours suivant l'application du collier et jusqu'à 8 mois. Prévention des réinfestations par les tiques (*Ixodes ricinus*) grâce à un effet acaricide (léthal) dans les 5 jours suivant l'application du collier et jusqu'à 8 mois, et à un effet répulsif (antigorgement) dans les 2 jours suivant l'application du collier et jusqu'à 8 mois. Prévention de la réinfestation par les tiques (*Rhipicephalus sanguineus*) grâce à un effet acaricide (léthal) dans les 16 jours suivant l'application du collier et jusqu'à 8 mois, et à un effet répulsif (antigorgement) dans les 14 jours suivant l'application du collier et jusqu'à 8 mois. Il est efficace contre les larves, les nymphes et les tiques adultes. Réduction du risque d'infection à *Leishmania infantum* transmise par les phlébotomes pendant 8 mois. L'effet est indirect via l'activité du médicament vétérinaire contre les vecteurs. **Contre-indications :** Ne pas traiter les chatons âgés de moins de 10 semaines/les chiots âgés de moins de 7 semaines. Ne pas utiliser en cas d'hypersensibilité aux substances actives ou à l'un des excipients. **Effets indésirables :** Peu fréquent (1 à 10 animaux / 1 000 animaux traités) : Réaction au site d'application (ex : érythème, perte de poils, prurit). Rare (1 à 10 animaux / 10 000 animaux traités) : Réaction au site d'application (ex : dermatite, eczéma, hémorragie, inflammation, lésion, grattage), Troubles du comportement (ex : mastication, léchage et toilettage excessifs, tendance à se cacher, hyperactivité, vocalisation), diarrhée, hypersalivation, vomissement, trouble de l'appétit, dépression. Pour les chiens : Symptômes neurologiques (ex : ataxie, convulsions, tremblement). Très rare (< 1 animal / 10 000 animaux traités, y compris les cas isolés) : Aggression. Pour les chiens : Réaction au site d'application (ex : dermatite, eczéma, hémorragie, inflammation, lésion). **Fréquence indéterminée** (ne peut être estimée sur la base des données disponibles) : Pour les chats : Dermatite de contact. Il est important de notifier les effets indésirables. À USAGE VÉTÉRIINAIRE. USAGE EXTERNE. TENIR HORS DE LA VUE ET DE LA PORTÉE DES ENFANTS. AMM n° FR/V/7549446 5/2025 & FR/V/9941402 1/2025 & FR/V/7162919 7/2025. Titulaire : Beaphar B.V., Drostenkamp 3, 8101 BX Raalte, Pays-Bas. Exploitant : Beaphar S.A.S., 2 Allée Vivaldi, Le San Giorgio, 06800 Cagnes sur mer, France. Tél : +33 (0)4.93.19.05.20. info@fr.beaphar.com